

ESIGENZE AMBIENTALI

INVESTIMENTO

GESTIONE BASSA MA..
Sebbene l'intensità di gestione richiesta dal miscuglio sia molto bassa, per il corretto sviluppo della cenosi è bene intervenire nei giusti momenti. Ad esempio, il taglio dovrà avvenire in post fioritura, per

LA CONCIMAZIONE NON E' ESSENZIALE!

Nonostante ciò che generalmente si pensa, le specie da fiore, adattate a condividere il terreno assieme a colture sfruttanti, non richie-









0	NAC	PC	1712	JE

COMPOSIZIONE	
SPECIE / VARIETÀ	GERMINABILITÀ MIN.
Agrostemma githago milas	70
Alcea ficifolia	70
Ammi maius	70
Bupleurum rotundifolium	70
Calendula officinalis	70
Carthamus tinctorius	70
Centaurea cyanus	70
Chrysanthemum ircutianum	70
Chrysanthemum segetum	70
Convolvulus tricolor	70
Coreopsis lanceolata	70

SPECIE / VARIETÀ	GERMINABILITÀ MIN.
Dianthus caryophyllus	70
Gaillardia aristata	70
Hesperis matronalis	70
Lavatera thuringiaca	70
Lavatera trimestris	70
Linum usitatissimum	70
Malope trifida	70
Malva sylvestris	70
Nigella sativa	70
Papaver rhoeas	
Zinnia elegans	





