

## DOLLAR SPOT - *Sclerotinia homeocarpa*

Fungo ascomicete, parassita facoltativo che attacca il tappeto erboso sia di microterme che di macroterme (*Cynodon dactylon*).

La malattia colpisce l'apparato fogliare evidenziando macchie necrotiche sulle lamine fogliari: sul bordo esterno sono di colore marrone-rossastro e progressivamente sbiancano fino ad un bianco paglierino centrale. Formano piccole macchie gialle clorotiche sui tappeti erbosi che non superano le dimensioni di una moneta.

Al mattino, in presenza di elevata umidità, è possibile individuare anche del micelio biancastro.

**PERIODO DI INFEZIONE: TARDA PRIMAVERA/TARDA ESTATE (15-25°C)**

### CONDIZIONI FAVOREVOLI

temperature intermedie, elevata umidità notturna (elevata differenza di notte), livelli scarsi di azoto nel terreno.

### SPECIE COLPITE

- Agrostis stolonifera*
- Festuca rubra*
- Poa pratensis*
- Festuca arundinacea*

### CONTROLLO AGRONOMICO

Garantire adeguata disponibilità di azoto, in particolar modo durante la primavera, per migliorare la vigoria del tappeto erboso e contrastare lo sviluppo del patogeno. Preferire irrigazioni al mattino, per consentire rapido asciugamento delle lamine ed evitare condizioni di anaerobiosi.

### CONTROLLO CHIMICO

Intervenire solamente con temperature superiori a 21°C con Propiconazolo, Iprodione, Triadimefon, Vinclozolin, Azoxystrobin.

Tecnico Seminart,

